

MINISTERO DELLA SALUTE
 DECRETO DEL 3 LUGLIO 2003
 TABELLA DELLE MENOMAZIONI ALLA INTEGRITA'
 COMPRESSE TRA 1 E 9 PUNTI DI INVALIDITA'
 (in Gazz. Uff., 11 settembre, n. 211)

CAPO	
Postumi soggettivi di trauma cranico commotivo eventualmente con frattura cranica semplice	2-4
Postumi di frattura del massiccio facciale o della mandibola (escluse le fratture dei condili mandibolari e le fratture delle ossa nasali) con turbe disfunzionali di lieve grado	2-5
Esiti di fratture del condilo mandibolare con modeste alterazioni funzionali dell'articolazione temporo mandibolare	3-8
Sindrome vertiginosa periferica da asimmetria labirintica compensata, strumentalmente accertata	2-5
Postumi di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale	2-6
Riduzione dell'olfatto fino alla perdita totale	=8
Riduzione isolata del gusto fino alla perdita totale	=5
Disturbo somatoforme indifferenziato lieve o disturbo dell'adattamento cronico lieve	=5
LESIONI DENTARIE	
Perdita di un incisivo centrale superiore	1,25
Perdita di un incisivo laterale o di un incisivo centrale inferiore	0,50
Perdita di un canino	1,50
Perdita del primo premolare	0,75
Perdita del secondo premolare	0,75
Perdita del primo molare	1,25
Perdita del secondo molare	1
Perdita del terzo molare	0,50
LESIONI OCULARI	
Riduzione monolaterale del visus per lontano, con acuita' visiva dell'altro occhio pari a 10/10:	
Visus residuo 9/10	1
Visus residuo 8/10	1
Visus residuo 7/10	3
Visus residuo 6/10	5
Visus residuo 5/10	7

Blefarospasmo, Lagofthalmo, Epifora, Ectropion, Entropion, obliterazione monolaterale delle vie lacrimali	=5
Necessita' di fare uso di lenti correttive	=3
COLONNA VERTEBRALE	
RACHIDE CERVICALE	
Esiti dolorosi di frattura di un'apofisi o dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo; a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei movimenti del capo	2-6
Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo	=2
Esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del capo e con disturbi trofico-sensitivi radicolari strumentalmente accertati	2-4
RACHIDE DORSALE	
Esiti dolorosi di frattura da schiacciamento di un corpo vertebrale da D1 a D10 con residua cuneizzazione	4-6
Esiti anatomici di frattura dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra dorsale senza schiacciamento del corpo; a seconda della sede e della alterazione anatomica	=4
RACHIDE LOMBARE	
Esiti dolorosi di frattura di un'apofisi o dello spigolo antero-superiore o antero-inferiore di una vertebra senza schiacciamento del corpo; a seconda della alterazione anatomica e/o della limitazione dei movimenti del tronco	2-6
Esiti di trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del tronco	=2
Esiti di trauma minore del rachide lombare con persistente rachialgia, limitazione antalgica dei movimenti del tronco e con disturbi radicolari trofico sensitivi strumentalmente accertati	2-5
SACRO E COCCIGE	
Esiti di frattura sacrale o coccigea malconsolidata con conseguente sindrome algico-disfunzionale	3-5

MINISTERO DELLA SALUTE
 DECRETO DEL 3 LUGLIO 2003
 TABELLA DELLE MENOMAZIONI ALLA INTEGRITA'
 COMPRESSE TRA 1 E 9 PUNTI DI INVALIDITA'
 (in Gazz. Uff., 11 settembre, n. 211)

ARTO SUPERIORE			
SPALLA			
Escursione articolare della scapolo-omero limitata globalmente di 1/3 (ad esempio: elevazione possibile per 110°, abduzione per 90° e rotazioni per due terzi)	9 d. - 7 n.d.	del pollice in estensione	
Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare	=4 d. - =3 n.d.	Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni dell'indice	9 d. - 6 n.d.
Esiti di documentata lussazione di spalla con sfumate ripercussioni funzionali	=4 d. - =3 n.d.	Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni del medio	6 d. - 5 n.d.
GOMITO		Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni dell'anulare	5 d. - 4 n.d.
Flessione limitata, possibile per 90° (da 180° a 90°) con prono-supinazione libera	8 d. - 7 n.d.	Anchilosi rettilinea delle tre articolazioni del mignolo	7 d. - 6 n.d.
Riduzione del movimento di prono-supinazione fino alla meta'	=5 d. - =4 n.d.	Esiti di frattura del primo osso metacarpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	=4 d. - =3 n.d.
POLSO		Esiti di frattura di ogni altro metacarpo, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	=3 d. - =2 n.d.
Rigidita' con riduzione di 2/3 della flessione estensione	9 d. - 8 n.d.	ARTO INFERIORE	
Rigidita' con riduzione della meta' della flessione estensione	6 d. - 5 n.d.	ANCA	
Instabilita' della radio-carpica di grado medio da lesione legamentosa accertata strumentalmente	3-6 d. - 2-5 n.d.	Limitazione di 1/4 dei movimenti	8
Instabilita' della radio-ulnare distale	=5 d. - =4 n.d.	Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare	=4
Esiti di frattura di scafoide con dolore e modica limitazione dei movimenti	=5 d. - =4 n.d.	GINOCCHIO	
MANO		Flessione possibile fino a 90° (da 180° a 90°)	=9
Perdita del medio	7 d. - 6 n.d.	Deficit dell'estensione tra 10° e 20°	3-8
Perdita dell'anulare	6 d. - 5 n.d.	Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare	=3
Perdita del mignolo	8 d. - 7 n.d.	Lassita' articolare da rottura totale di uno dei due legamenti collaterali non operata	9
Perdita della falange ungueale dell'indice	5 d. - 4 n.d.	Lassita' articolare da lieve a media conseguente a lesioni legamentose parziali o in esiti di interventi di ricostruzione di un legamento	2-7
Perdita della falange ungueale del medio	3 d. - 2 n.d.	Esiti di meniscectomia parziale artroscopica senza limitazione funzionale	2
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3 d. - 2 n.d.	Esiti di meniscectomia totale senza limitazione funzionale	4
Perdita della falange ungueale del mignolo	4 d. - 3 n.d.	CAVIGLIA	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	8 d. - 7 n.d.	Limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di 1/2	6
Perdita delle ultime due falangi del medio	5 d. - 4 n.d.	Limitazione dei movimenti articolari della tibio-tarsica di 1/3	4
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	4 d. - 3 n.d.		
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	6 d. - 5 n.d.		
Anchilosi dell'articolazione interfalangea	5 d. - 4 n.d.		

MINISTERO DELLA SALUTE
 DECRETO DEL 3 LUGLIO 2003
 TABELLA DELLE MENOMAZIONI ALLA INTEGRITA'
 COMPRESSE TRA 1 E 9 PUNTI DI INVALIDITA'
 (in Gazz. Uff., 11 settembre, n. 211)

----- Anchilosi isolata della sottoastragalica in posizione favorevole	6	----- Esiti attendibilmente dolorosi di frattura di clavicola consolidata con callo deforme e/o sovrapposizione dei monconi senza significativa limitazione articolare	2-5
----- Limitazione dei movimenti articolari della sottoastragalica di 1/2	3	----- Frattura di clavicola evoluta in pseudoartrosi	6 d. - 5 n.d.
----- Esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit della escursione articolare	=3	----- Esiti di lussazione sterno-claveare	=3
----- Lesione legamentosa tibio-astragalica o peroneo-astragalica (a seconda del grado di instabilita' clinicamente rilevabile)	2-5	----- Persistente lussazione completa acromion-claveare	5 d. - 4 n.d.
----- PIEDE		----- Esiti attendibilmente dolorosi di frattura dello sterno con callo deforme	2-4
----- Anchilosi della I metatarso-falangea in posizione favorevole	5	----- Sindrome algica da esiti anatomici di frattura di una costa radiologicamente rilevati	1-2
----- Anchilosi dell'interfalangea del I dito in posizione favorevole	3	----- Esiti anatomici di fratture costali multiple radiologicamente rilevate; per ogni costa consolidata con callo deforme e dolente	1
----- Perdita dell'alluce	6	----- Esito di pleurite traumatica monolaterale con abolizione del recesso costo-frenico	1-3
----- Perdita delle altre dita del piede a seconda del numero	=7	=====	
----- Esiti dolorosi di frattura dello scafoide tarsale o del cuboide o di un cuneiforme, con sfumate ripercussioni funzionali	=4	BACINO E ADDOME	
----- Esiti di frattura del I e del V metatarso	=3	=====	
----- Esiti di frattura del II o III o IV metatarso	=2	----- Esiti attendibilmente dolorosi di frattura extrarticolare di bacino ben consolidata e in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	3-5
----- ALTRI ESITI ANATOMICI DELL'ARTO INFERIORE		----- Diastasi isolata della sinfisi pubica fino a 4 cm	3-8
----- Accorciamento di 2 cm	3	----- Esiti di lesione epatica contusivo-emorragica e/o discontinuativa con funzionalita' normale, eventualmente con modesti postumi aderenziali, a seconda della estensione	5-8
----- Esiti dolorosi di frattura diafisaria di femore o di tibia ben consolidata, con persistenza di mezzi di sintesi, ma in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	5-7	----- Esiti di lesione renale contusivo-emorragica e/o discontinuativa ecograficamente accertata con funzionalita' normale, eventualmente con cicatrici	3-6
----- Esiti dolorosi di frattura diafisaria isolata di tibia o femore ben consolidata in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	=4	----- Perdita di un testicolo in eta' post-puberale con funzionalita' normale del testicolo superstite, a seconda dell'eta'	5-8
----- Esiti dolorosi di frattura diafisaria isolata di perone ben consolidata in assenza o con sfumata ripercussione funzionale	=2	----- Perdita anatomica e/o funzionale di un ovaio in eta' fertile con funzionalita' normale dell'ovaio superstite, a seconda dell'eta'	5-8
----- Flebo-linfopatie arti inferiori - lieve edema regredibile mediante adeguata elastocompressione e sfumata discromia cutanea	=5	----- Cicatrici che indeboliscono la parete addominale; per ogni 10 cm di lunghezza	2
=====		----- Laparoccele, dimensioni entro cm 10 x 10	4-8
TORACE		----- DANNO ESTETICO	
----- Esiti attendibilmente dolorosi di frattura non articolare della scapola	1-2	----- Il pregiudizio estetico complessivo e' lieve	=5
----- Esiti attendibilmente dolorosi di frattura di clavicola regolarmente consolidata senza limitazioni articolari	1-2	----- Il pregiudizio estetico complessivo e' da lieve a moderato	6-9